



Tener buena salud es un regalo que todos quisiéramos para los niños, pero esto no sucede sin su ayuda.

He aquí algunas recomendaciones para mantener a su hijo sano:

- introducir buenos hábitos alimentarios a una edad temprana y ser un buen ejemplo a seguir;
- fomentar actividades recreativas y físicas;
- estar al día con las vacunas recomendadas.

En Blue Cross and Blue Shield of Texas queremos que su hijo esté bien.

Guía para el bienestar de los niños Cómo sentar las bases para un futuro saludable

Salud infantil

Procure el bienestar de su hijo. Programe una consulta preventiva anual con el prestador de servicios médicos* de su hijo y siga el esquema de vacunación. El prestador de servicios médicos evaluará el desarrollo y progreso de su hijo, y hablará con usted acerca de sus hábitos de alimentación y sueño, seguridad y problemas de conducta.

De acuerdo con las recomendaciones del programa de promoción de salud Bright Futures de la Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics), el prestador de servicios médicos debe hacer lo siguiente:

- revisar el percentil del índice de masa corporal de su hijo periódicamente a partir de los 2 años;
- revisar la presión arterial una vez al año, a partir de los 3 años;
- hacer una prueba de audición al nacer, después una anual de los 4 a los 6 años, y luego a los 8 y 10 años;
- hacer un examen anual de la vista de los 3 a los 6 años, y luego a los 8, 10, 12 y 15 años.

Ayude a proteger a su hijo de las enfermedades. Asegúrese de que le administren las vacunas recomendadas que se muestran en las tablas. Si a su hijo le faltan vacunas, pregúntele al profesional médico cómo ponerse al día.

Infórmese con el pediatra de su hijo o en línea, en healthychildren.org/Spanish.

Tenga en cuenta que, estas recomendaciones son para niños saludables que no tienen ningún riesgo especial para la salud. Dedique tiempo para revisar los siguientes resúmenes de servicios preventivos clave.

* Un prestador de servicios médicos puede ser un médico, prestador de atención primaria, asistente médico, practicante de enfermería u otro profesional médico.

Esquema de vacunación recomendado para niños y adolescentes hasta 18 años

Lista de vacunas y otros agentes inmunizantes para niños y adolescentes

| Vacunas y otros agentes inmunizantes | Nacimiento | 1 mes | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 19 a 23 meses | 2 a 3 años | 4 a 6 años | 7 a 10 años | 11 a 12 años | 13 a 15 años | 16 años | 17 a 18 años | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Virus sincicial respiratorio (RSV-mAb [Nirsevimab]) | 1 dosis dependiendo del estado de vacunación contra el RSV de la madre (ver notas) | | | | | 1 dosis (8 a 19 meses), ver notas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis B (HepB) | 1. ^a dosis | 2. ^a dosis | | | | 3. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotavirus (RV): RV1 (serie de 2 dosis), RV5 (serie de 3 dosis) | | | 1. ^a dosis | 2. ^a dosis | ver notas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP menos de 7 años) | | | 1. ^a dosis | 2. ^a dosis | 3. ^a dosis | | | 4. ^a dosis | | | | 5. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b (Hib) | | | 1. ^a dosis | 2. ^a dosis | 3. ^a dosis | | 3. ^a o 4. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neumocócica conjugada (PCV15, PCV20) | | | 1. ^a dosis | 2. ^a dosis | 3. ^a dosis | | 4. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) | | | 1. ^a dosis | 2. ^a dosis | 3. ^a dosis | | | | | | 4. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | | | |
| COVID-19 (1vCOV-mRNA, 1vCOV-aPS) | | | | | | ver notas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Influenza (IIV3, CCIIV3) | 0 | | | | | | 1 o 2 dosis por año | | | | | | 1 dosis por año | | | | | | | | | | | | | |
| Influenza (LAIV3) | | | | | | | 1 o 2 dosis por año | | | | 1 dosis por año | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarampión, paperas y rubéola (MMR) | | | | | ver notas | | 1. ^a dosis | | | | 2. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varicela (VAR) | | | | | | 1. ^a dosis | | | | 2. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis A (HepA) | | | | | ver notas | | Series de 2 dosis (ver notas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap menos de 7 años) | | | | | | | | | | | 1 dosis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) | | | | | | | | | | | ver notas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna meningocócica (MenACWY-CRM ≥2 meses, MenACWY-TT ≥2 años) | | ver notas | | | | | | | | | | 1. ^a dosis | 2. ^a dosis | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna meningocócica B (MenB-4C, MenB-FHbp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna contra el virus sincicial respiratorio (RSV [Abrysvo]) | | | | | | | | | | | Administración por temporada durante el embarazo (ver notas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna contra el dengue (DEN4CYD: 9 a 16 años) | | | | | | | | | | | Seropositivo en zonas donde el dengue es endémico (ver notas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna contra la viruela del mono (Mpox) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rango de edades recomendados para todos los niños

Rango de edades recomendados para estar al día con las vacunas

Rango de edades recomendados para ciertos grupos o poblaciones de alto riesgo

Vacunación recomendada puede empezar en este grupo de edad

Vacunación según decisiones clínicas compartidas

Sin guías/no aplica